OSIRIS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ingredientes activos:

Azoxystrobin: 200 g/L

Difenoconazole: 125 g/L

Número CAS:

Azoxystrobin: 131860-33-8

Difenoconazole: 119446-68-3

Grupo Químico:

Azoxystrobin: Estrobilurinas

Difenoconazole: Triazoles

Uso: Fungicida

Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Concentración: 32.5%

Registro SENASA: PQUA N° 2642-SENASA

Formulador: Nanjing Rhonquim Co. LTD

Titular del registro: BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.

Importador y distribuidor autorizado: BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Amarillo pálido opaco

Olor: Inodoro

Densidad: 1.15 g/mL

Explosividad: No explosividad

Corrosividad: No corrosivo

Inflamabilidad: Inflamable

Estabilidad: 2 años

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

OSIRIS, es un fungicida que combina dos ingredientes activos: Azoxystrobin y Difenoconazole. Actúa de forma sistémica y de contacto afectando el metabolismo energético e inhibiendo la síntesis del ergosterol de la pared celular del hongo, que conlleva finalmente la muerte del hongo.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	(días)	(ppm)
Uva	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.5	14	2[1] 3[2]

P.C.: Periodo de carencia **L.M.R.**: Límite máximo de residuos

(1) Azoxystrobin

(2) Difenoconazole

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **OSIRIS** en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Considerando 1 campaña al año. De ser necesaria una segunda aplicación, realizarla con un intervalo de 14 a 20 días.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

OSIRIS es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda hacer una pequeña prueba antes de hacer una mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

OSIRIS, no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase, verter la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Finalmente, deposite el envase en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ