DIMETHOQUIM 400 EC

CARACTERISTICAS GENERALES

Ingredientes activos:

Dimethoate: 400 g/L

Número CAS:

60-51-5

Grupo Químico: Organofosforados

Uso: Insecticida

Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)

Concentración: 40.0%

Registro SENASA: PQUA N° 1495-SENASA

Formulador: Nanjing Fengshan Chemical Co., Ltd.

Titular del registro: BIOQUIMICA AGRICOLA DEL PERU S.A.C.

Importador y distribuidor autorizado: BIOQUIMICA AGRICOLA DEL PERU S.A.C.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Azul

Olor: Mercaptano

Densidad: 1.08 – 1.20 g/ml

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

Inflamabilidad: Inflamable

Estabilidad: 2 años

GENERALIDADES

DIMETHOQUIM 400 EC es un insecticida organofosforado de acción sistémica y de contacto; principalmente actúa sobre insectos picadores y chupadores como las queresas.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

DIMETHOQUIM 400 EC es un insecticida sistémico organofosforado que actúa sobre los insectos por contacto e ingestión. Es un insecticida inhibidor de la acetilcolinesterasa que causa la sobreestimulación del sistema nervioso del insecto y muerte posterior.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	0.25	1.25	21	0.02
Palto	Queresa	*Fiorinia fioriniae*	0.2	0.8	7	0.02

P.C.: Periodo de carencia **L.M.R.**: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **DIMETHOQUIM 400 EC**, 2 veces por campaña como máximo, con un intervalo de 7-10 días entre aplicaciones, considerando 2 campañas por año. Las aplicaciones deberán realizarse cuando el nivel de plaga sea bajo y ésta se encuentre en los primeros estadíos. Rotar con insecticidas de diferente ingrediente activo o diferente mecanismo de acción entre aplicaciones y de manera oportuna para evitar la generación de resistencias en la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas durante las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DIMETHOQUIM 400 EC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte.

Para mayor seguridad, realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

FITOTOXICIDAD

DIMETHOQUIM 400 EC no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase, verter la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Finalmente, deposite el envase en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ