

WOLVERINE

50 WG

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ingrediente activo:

Emamectin benzoato: 50 g/Kg

Número CAS:

155569-91-8

Grupo Químico: Avermectinas

Uso: Insecticida

Formulación: Gránulos dispersables (WG)

Concentración: 5.0%

Registro SENASA: PQUA N° 1315 - SENASA

Formulador: Norchem Jiangsu Corporation

Titular del registro: BIOQUIMICA AGRICOLA DEL PERU S.A.C.

Importador y distribuidor autorizado: BIOQUIMICA AGRICOLA DEL PERU S.A.C.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Estado físico: Sólido granulado

Color: Blanco a beige

Olor: Olor característico

Densidad: 0.6 g/mL a 20 °C

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

Inflamabilidad: No inflamable

Estabilidad: 2 años

GENERALIDADES

WOLVERINE 50 WG, es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad translaminar utilizado para el control de larvas de lepidópteros y otros minadores de hojas.

WOLVERINE 50 WG, se prepara diluyendo la dosis recomendada en un cilindro con la mitad de volumen de agua, agitar bien y completar al volumen total.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

WOLVERINE 50 WG es un insecticida que actúa principalmente por ingestión, pero con alguna acción de contacto. Actúa de manera translaminar en las hojas.

WOLVERINE 50 WG actúa interfiriendo con el funcionamiento normal del ácido gamma aminobutírico (GABA), que es el transmisor primario de la sinapsis, lo que ocasiona un incremento en la permeabilidad de los iones de cloruro en las membranas del nervio y músculo, causando la parálisis del insecto.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	(días)	(ppm)
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	30	0.01
Pimiento	Gusano perforador de bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	7	0.02

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: límite máximo de residuos

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **WOLVERINE 50 WG** hasta tres aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, considerando 2 campañas por año para los cultivos de espárrago y pimiento.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

WOLVERINE 50 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda hacer una pequeña prueba antes de hacer una mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

WOLVERINE 50 WG, no es fitotóxico usado en las dosis y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase, verter la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Finalmente, deposite el envase en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



BIOQUÍMICA S
AGRÍCOLA DEL PERÚ C